

衛教資訊

新竹馬偕紀念醫院

地址：
30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：
03-5166868 · 03-6119595

電子郵件：
hcservice@mmh.org.tw

- 健康諮詢專線：03-5745098
週一 ~ 週五上午 9:00~12:00
下午 14:00~17:00
例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866
週一 ~ 週五 上午 8:00~17:00
週六 上午 8:00~12:00

臍帶護理指導

修訂: 2018/10/15

護理部 新生兒病房



新竹馬偕紀念醫院

Hsinchu MacKay Memorial Hospital

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

一、目的：

- 1.維持臍帶乾燥促進脫落。
- 2.預防臍帶感染發炎。

二、用物：

臍帶護理包一份，內含：95%酒精及小棉枝。

三、方法及時機：

- 1.沐浴後或臍帶被大、小便污染時需執行臍帶護理。
- 2.將 95%酒精滴濕在無菌小棉枝上，從臍帶根部由裡往外環形擦拭。
- 3.若有微量淡黃色分泌物時，應取新的酒精棉枝消毒至乾淨為止，勿重複來回消毒。

四、注意事項：

- 1.執行臍帶護理前，請先用肥皂洗手。

2. 臍帶脫落約需 2-3 星期。

3. 臍帶脫落後 2-3 天會有微量出血情形，此為正常現象，繼續執行直到根部乾淨乾燥為止。

五、若有下列情況請立刻就醫：

1. 臍帶根部周圍皮膚有紅腫、異味或濃稠分泌物。

2. 發燒現象。

~如需轉載本篇文章或有任何疑問，請洽 新竹馬偕紀念醫院新生兒病房~