

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：

03-5166868，03-6119595

電子郵件：

service@ms7.mmh.org.tw

- 健康諮詢專線：03-6118865
週一～週五 上午 9:00~12:00
下午 14:00~17:00
週六至中午 12:00，例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866
週一～週五上午 8:00~17:00
週六上午 8:00~12:00

修訂: 2014/04/24

小兒外科



新竹馬偕紀念醫院

MacKay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

症狀:

1. 尿道開口不在正常龜頭位置，而低於正常之位置。
2. 若合併纖維腱索，則陰莖彎曲，勃起時彎曲更明顯。
3. 包皮只覆蓋龜頭背側，陰莖的腹側沒有包皮。

治療:

手術時機最好是在六個月至一歲

1. 輕微的病人只須要擴大尿道口，並移到龜頭前端即可。雖然須要全身麻醉，但不須住院，可立即回家。
2. 如果尿道開口在陰莖中間，就須要將陰莖彎曲處矯正拉直，並利用包皮作出新的尿道，使尿道開口在龜頭頂端。
3. 嚴重病例因為尿道開口較低，在陰囊之間，並且陰莖較小，手術常須分兩次進行，第一次重建尿道，第二次進行修補及陰囊成形手術。

尿道下裂手術的目標：

1. 讓陰莖挺直。
2. 尿道開口儘量靠近龜頭頂端。
3. 沒有漏尿處。

預後:

尿道下裂手術成功率不一，嚴重病例常有失敗現象，須多次手術才能成功。輕微病例則通常能一次矯正完成。手術時必需慎選有經驗的醫師，並耐心與他配合，才能使小孩達到最好的治療目標與心理重建。

➤ 新竹馬偕紀念醫院，關心您的健康。